

MEGABRIC NIACIN

Meghatározás:

Takarmány kiegészítő, lassan oldódó bolusz szarvasmarhák részére.

Átlagos feloldódási ideje a bendőben több mint 6 hét


A Megabric Niacinjavasolt:

Az acetonémia, a ketózis és a zsírmáj szindróma kialakulás esélyének a csökkentésére.

Technikai háttér:

A Megabric Niacin használatának hatására

- Csökken a lipidek szintje a vérben és a ketontestek a vérben és a vizeletben
- Emelkedik a vércukor szint.
- Fokozódik az illózsírsavak, különösen a propionsav termelés.
- kisebb testsúly csökkenés az ellést követő időszakban
- Megelőzhető a laktáció első 3 hónapjában a zsírmáj szindróma.
- Intravénás kezelések után (energia pótlás, májvédők) segíti a szervezet regenerálódását.



Összetétel:

- Magnézium 6%
- Kobalt 25 mg
- Mangán 1550 mg
- Niacin 36 250 mg

Használati utasítás:

1 bólusz/állat megelőzésre

1 bólusz/állat azonnal amint a betegség tünetei megjelennek

A bólusz oldódása kb. 3 nap. Amennyiben szükséges 3 nap múlva megismételhető 1 bólusz alkalmazása.

Figyelmeztetések:

Ne törje el a boluszt. Mindig használja az aplikátort.

Ne fejtse ki túl nagy erőt a bólusz beadásakor.

Ne használja elfeküdt tehenek esetén.

Kiszerelés

Polysztirén doboz 10 bolusszal. (10 adag)

Boluszonként 58 g



Minőségét megőrzi: A gyártástól számított 18 hónap.