

## PROMIX MARSTOP

Hasmenéses fiatal állatok kezelésére, a tünetek megjelenésével egy időben való alkalmazására. Segít a hasmenéssel járó dehidratálás megelőzésében, az energia- és ionháztartás egyensúlyának helyreállításában. Segít a bélnyálkahártyájának regenerálásában. Stresszhelyzetekben (szállítások, szállásváltoztatás stb.), a stressz okozta nem kívánatos hatások megelőzésére.

### Garantált beltartalom ill. hatóanyagtartalom:

Szárazanyag 90 %

Nátrium: 1,9 %

Magnézium: 1,3 %

Kálium: 1,3 %

A vitamin: 75 NE/g

C vitamin: 2000 mg/kg

E vitamin acetát 150 mg/kg

B-6 vitamin 700 mg/kg

**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:** 0 nap

**Tárolás:** Száraz, hűvös helyen tárolandó

**Minőségét megőrzi:** Gyártás időpontjától számított 1 év

**Kiszerezés:** 5 kg-os, polietilén zsákkal bélelt műanyag vödör, illetve 20 kg-os polietilénnel bélelt zsák



## **Előkészítés:**

100g Marstop készítményt fel kell oldani 2liter testmeleg (37-39 C-os) vízben.

## **Adagolás:**

Borjak hasmenéses megbetegedése esetén:

Első és második napon: egyenlő időközökben 3-4 alkalomra elosztva 2 L Marstop oldatot kell itatni a borjakkal.

Harmadik naptól az ötödik napig napi egy alkalommal 2 L Marstop oldatot kell itatni a borjakkal lehetőleg délben, reggel és este csökkentett adag tejpótló (fél-háromnegyed adag) itatása mellett. A tünetek megszűnte után vissza lehet térni a technológia szerinti takarmányozásra.

Stresszhatások esetében:

Első nap reggel és este 2 L Marstop oldatot kell adagolni.

Második, harmadik és negyedik napon naponta 2 L Marstop oldatot kell adagolni ( lehetőleg délben) Az ötödik naptól vissza lehet térni a technológia szerinti takarmányozásra.

## **FIGYELMEZTETÉS**

A MARSTOP adagolása fertőzőes emésztőrendszeri zavarok esetén nem helyettesíti az antibiotikus kezelést, annak kiegészítéseként alkalmazandó.

